INFO CALCI BOVIN

N°595
2 NOV 2010

CALCIALIMENT SNA sna@calcialiment.fr Z.I. de la gare 22690 Pleudihen sur Rance Tél. 02 96 83 07 36

Contacter Etienne CHEVE 06 85 72 21 96 pour recevoir les alertes cotations par SMS

TOURTEAUX DE SOJA →

€/$: 1,401
Pétr. : 83,27 $/b

Contacter SNA au 02 96 83 07 36 Fax 02 96 83 07 38

	DISPO	NOV.	2 DE DEC.	3 DE FEV.	6 DE MAI
MONTOIR	343	335	331	331	310
LORIENT	333	336	332	332	311
BREST farine	334	337	333	333	312
GAND 49% Farine	330	331	334	336	320
GAND PCR	402	403	434	398	380
MONTOIR PCR		373	376	376	349

NOUVEAU BOVI+ :
PDIA : 28g/kg ….. PDIE : 85g/kg ….. PDIN : 65g/kg

Les exportateurs américains continuent d'expédier le soja à un rythme accéléré.
L' USDA a annoncé hier que plus de 1,62 millions de tonnes de soja avaient été exportées la semaine dernière.
La météo est idéale pour les semis qui progressent bien dans le Sud du Brésil et en Argentine.

Surveillez le prochain rapport USDA du 10 Novembre.
Finir vos couvertures en PCR sur l'hiver.
Suivre de près les couvertures sur les 3 de Février et les 6 de Mai.
Le manque de graines de colza dans les usines ralentit le rythme de trituration.

Pensez à l'achat de pois en complément du ttx de colza.

Cotations indicatives pouvant varier selon les tendances du marché, le cours du dollar, les mensualités,les disponibilités de marchandises et de transports au moment de passer les ordres.

TOURTEAUX DE COLZA DEPART →

* prix pour des séries complètes (prévoir +3€ pour camions isolés)

Contacter SNA au 02 96 83 07 36

	Rouen*	Montoir	Meriot*	Anvers	Baleyc.
NOVEMBRE	226	228	221	218	219
2 DE DECEMBRE	226	228	219	218	217
3 DE FEVRIER	219	228	214	217	212
3 DE MAI	204	220	209	214	207

Chargement camions vis ttx colza Montoir +5 €/T

AUTRES PRODUITS

Luzerne bouchons	Dispo. **174€/T** 18% départ Marne
Drèches de blé	2 de Fev. **227€/T** départ Gand
Pulpe bouchons	3 de Novembre **175€/T** 6mm départ Marne
Corn gluten	3 de Janvier **178€/T** départ Nord
MAÏLUZ	**Disponibilité départ Ardennes 08**

CEREALES →

Majorations du 1er au 15 Nov. : 3,26€/T

	Départ 36	Rendu Rouen	Rendu Pontivy
BLE	198	221	225
ORGE	178	185	198
MAÏS	198	194 F Bordeaux	215
POIS	**220 €/T** départ 36		
Triticale dpt 36 **188€/T**			

Les récoltes de maïs US sont en avance par rapport aux années précédentes. Mais les cours restent soutenus par l'anticipation d'une baisse des rendements pour le prochain rapport USDA
Avancez rapidement sur les 3 de Novembre en céréales.





LES INCONTOURNABLES

LA MELASSE

LA MELASSE améliore la solubilité et l'appétence de la ration

Conditionnement en container de 1000 litres pour un poids de 1300kg à 1400kg

Mode d'emploi: de 300gr à 1 kg par vache selon la ration

La mélasse, un concentré appétant à associer à des pailles ou des foins moyens.

La forte teneur en sucres de la mélasse (65% de la MS) est un atout pour favoriser, à bon marché, une consommation élevée de fourrages de moindre qualité (pailles, foins moyens).

La mélasse doit toujours est considérée comme un concentré et utilisée comme tel:

- la ration de base comportera suffisamment d'aliments fibreux et de brins longs pour limiter les troubles digestifs.
- son excès est beaucoup moins bien utilisé que l'excès d'amidon de céréales et il peut perturber le bon fonctionnement du rumen.
- sa forte teneur en potassium nécessite une complémentation ionique par une pierre à lécher.

CALCI MAG

CALCI MAG améliore le taux musculaire, réduit les risques de tétanies d'herbage, les fièvres de lait, les rétentions placentaires et renforce les défenses immunitaires

Conditionnement en container de 1000 litres pour un poids de 1350 kg

Mode d'emploi:

Pour la mise à l'herbe, dans l'eau de boisson 0.1litre/jour

En entretien dans la ration ou l'eau de boisson 0.2 litre/jour pendant 10 jours et ensuite 0.1 litre/jour

Comme anti-poussière: 2% de l'aliment

e magnésium pour la vache laitière

Une vache adulte compte, en réserve osseuse, à peine 300 g de Mg, pour 9 kg de calcium et 6 kg de phophore. C'est dire qu'un déficit en Mg et ses conséquences surviennent très vite. C'est la tétanie d'herbage sur les fourrages de printemps. La vache est prise soudainement de crampes, ses yeux sont exorbités et elle reste couchée dans la pâture.

Mais, même si une ration couvre les besoins en Mg, elle est encore loin d'en garantir un apport suffisant. En effet, le Mg étant uniquement absorbé au niveau du rumen, plusieurs facteurs peuvent réduire la valorisation du Mg par la vache: la teneur des rations en protéines, en potassium, en sodium, en fibres, les combats, les chaleurs, les écarts de température extérieures.

Ces situations d'apport trop serré en Mg entraînent une ingestion alimentaire plus faible avec le risque de cétose par déficit énergétique lors des premières semaines après le vêlage. En plus, un manque de Mg favorise la fièvre de lait par rétention du calcium osseux, avec plus de mammites et de rétention placentaire.

CALCIAZOTE

CALCIAZOTE, son équilibre azoté non protéique et en soufre permet la production d'acide aminé soufré

CalciAzote contient 80% d'urée

Conditionnement en sac de 25kg ou en big-bag

Mode d'emploi: maxi 190 gr par animal

ngestion alimentaire chez la vache laitière

L'ingestion est la clé des rations complètes et semi-complètes pour obtenir de bons résultats dans une exploitation laitière. Toutefois, il s'avère difficile de bien la prévoir. L'ingestion alimentaire est liée à la fois à la vache et à l'alimentation.

Les facteurs dépendants de la vache:

- la production laitière: +0.330 kg de MS / kg de lait std.
- le poids vif: 1à 1.3 kg de MS / 100 kg de poids vif en +.
- le stade de lactation: les écarts d'ingestion sont les plus élevés autour du vêlage. L'ingestion augmente fortement pendant les 2 premières semaines de lactation. Le maximum est atteint après 2 mois et reste constant du 3è au 6è mois de lactation.

Pour tous renseignements sur les tarifs ou le mode d'emploi contacter votre interlocuteur habituel
ou Annie Claude Régeard au 02 96 83 32 38